

**ANALISI MATEMATICA 1**  
**Area dell'Ingegneria dell'Informazione. Appello del 17.01.2022**

**TEMA 1**

**Esercizio 1 [10 punti]** Data la funzione

$$f(x) = \arctan\left(\frac{|x+1|}{x^2+4}\right),$$

(i) individuarne il dominio naturale:

$$\text{Dominio} = \mathbb{R};$$

studiarne il segno:

$$f(x) \geq 0 \iff \frac{|x+1|}{x^2+4} \geq 0 \quad \text{Dunque } f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Inoltre } f(x) = 0 \iff x = -1;$$

calcolare i limiti agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan\left(\frac{|x+1|}{x^2+4}\right) \underset{y = \frac{|x+1|}{x^2+4}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \arctan y = 0,$$

dunque  $y = 0$  asintoto orizzontale a  $-\infty$  e a  $+\infty$ .

(ii) Studiare la derivabilità di  $f$  sul suo dominio, calcolare la derivata prima:

Studiamo  $f$  separatamente nelle regioni

$$x > -1 \iff |x+1| = x+1 \text{ e}$$

$$x < -1 \iff |x+1| = -(x+1), \text{ per cui si ha:}$$

$$f(x) = \arctan\left(\mp \frac{(x+1)}{x^2+4}\right) \quad x \leq -1,$$

e quindi

$$f'(x) = \frac{\mp \frac{x^2+4-2x(x+1)}{(x^2+4)^2}}{1 + \frac{(x+1)^2}{(x^2+4)^2}} = \pm \frac{x^2+2x-4}{(x^2+4)^2 + (x+1)^2} \quad \text{if } \leq -1,$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) = -\frac{1}{5} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x) = \frac{1}{5} \implies f'_-(-1) = -\frac{1}{5}, \quad f'_+(-1) = \frac{1}{5}.$$

Dunque la funzione derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$  mentre in  $x = -1$  vi un punto angoloso.

Studiare gli intervalli di monotonia:

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x < -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2+2x-4 \geq 0 \\ x < -1 \end{cases} \iff x \leq -1 - \sqrt{5}$$

Dunque la funzione strettamente crescente in  $] -\infty, -1 - \sqrt{5}[$  e strettamente decrescente in  $] -1 - \sqrt{5}, -1[$ .

Inoltre

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x > -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2+2x-4 \leq 0 \\ x > -1 \end{cases} \iff -1 < x \leq -1 + \sqrt{5}.$$




Figure 1: Grafico della funzione.

Dunque la funzione è strettamente crescente in  $]-1, -1 + \sqrt{5}[$  e strettamente decrescente in  $]-1 + \sqrt{5}, +\infty[$ . Infine,

$$f'(-1 + \sqrt{5}) = f'(-1 - \sqrt{5}) = 0$$

e i punti  $-1 - \sqrt{5}$ ,  $-1 + \sqrt{5}$  sono di massimo relativo. Da  $f(-1) = 0$ , il punto  $x = -1$  è punto di minimo assoluto.

(iii) abbozzare il grafico di  $f$ .

**Esercizio 2 [7 punti]** Determinare le soluzioni in  $\mathbb{C}$  dell'equazione

$$\left(\frac{z}{i}\right)^3 = -8 \iff z^3 = 8i = 8 \left( \cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{2}\pi\right) \right)$$

Dobbiamo cioè trovare le radici terze di  $8i$ , cioè, con la formula di De Moivre,

$$z_0 = 2 \left( \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) \right) = \sqrt{3} + i$$

$$z_1 = 2 \left( \cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{5}{6}\pi\right) \right) = -\sqrt{3} + i$$

$$z_2 = 2 \left( \cos\left(\frac{3}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) \right) = -2i.$$

(Stanno sui vertici di un triangolo equilatero inscritto nel cerchio di raggio 2 con un vertice in  $-2i$ )

**Esercizio 3 [7 punti]**

(i) Mediante opportuni sviluppi di Taylor, determinare, al variare di  $\alpha \in \mathbb{R}$ , uno sviluppo della successione

$$a_n = \frac{1}{n} - \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right) \quad \text{per } n \rightarrow +\infty.$$

Si ha

$$a_n = \frac{1}{n} - \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{120n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) - \alpha \frac{1}{n^3} + \alpha \frac{1}{2n^6} + o\left(\frac{\alpha}{n^6}\right) =$$

$$= \frac{1-6\alpha}{6n^3} - \frac{1}{120n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right)$$

(ii) Studiare la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n.$$

Da

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1-6\alpha}{6n} - \frac{1}{120n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right)$$

segue che, per  $\alpha = \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è sempre negativo per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n^3}$ . Pertanto la serie converge. Se invece  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è di segno costante per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n}$ . Pertanto la serie diverge per  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ .

#### Esercizio 4 [8 punti]

(i) Usando la definizione, calcolare l'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 8 \arctan t + 17)} dt;$$

Consideriamo la sostituzione  $y = \arctan t$ , che implica  $dy = \frac{1}{1+t^2} dt$ :

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 8 \arctan t + 17)} dt &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^{\arctan c} \frac{y}{y^2 + 8y + 17} dy = \\ &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{2} \log((y+4)^2 + 1) - 4 \arctan(y+4) \right]_0^{\arctan c} \\ &= \frac{1}{2} \log((\pi/2 + 4)^2 + 1) - 4 \arctan(\pi/2 + 1) - \frac{1}{2} \log 17 + 4 \arctan(4) \end{aligned}$$

dove abbiamo usato:

$$\begin{aligned} \int \frac{y}{y^2 + 8y + 17} dy &= \int \frac{y}{y^2 + 8y + 16 + 1} dy = \frac{1}{2} \int \frac{2(y+4)}{(y+4)^2 + 1} dy - 4 \int \frac{1}{(y+4)^2 + 1} dy = \\ &= \frac{1}{2} \log((y+4)^2 + 1) - 4 \arctan(y+4) + c, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

*Facoltativo* discutere la convergenza dell'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{2\alpha} (\arctan^2 t + 8 \arctan t + 17)} dt;$$

per ogni  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

L'integrando, per  $t \rightarrow +\infty$ , è asintotico a

$$\frac{C}{t^{4\alpha}}$$

per una opportuna costante  $C > 0$ , dunque l'integrale converge per

$$4\alpha > 1 \iff \alpha > \frac{1}{4}.$$

## TEMA 2

**Esercizio 1 [10 punti]** Data la funzione

$$f(x) = \arctan\left(\frac{|2x+1|}{x^2+5}\right),$$

(i) individuare il dominio naturale:

$$\text{Dominio} = \mathbb{R};$$

studiarne il segno:

$$f(x) \geq 0 \iff \frac{|2x+1|}{x^2+5} \geq 0. \quad \text{Dunque } f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}. \quad \text{Inoltre } f(x) = 0 \iff x = -\frac{1}{2};$$

calcolare i limiti agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan\left(\frac{|2x+1|}{x^2+5}\right) \underset{y=\frac{|2x+1|}{x^2+5}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \arctan y = 0;$$

Dunque  $y = 0$  asintoto orizzontale a  $-\infty$  e a  $+\infty$ .

(ii) studiare la derivabilità di  $f$  sul suo dominio, calcolare la derivata prima:

Studiamo separatamente  $f$  nelle regioni

$$x > -\frac{1}{2} \iff |2x+1| = 2x+1 \text{ e}$$

$$x < -\frac{1}{2} \iff |2x+1| = -2x-1, \text{ per cui si ha:}$$

$$f(x) = \arctan\left(\mp \frac{(2x+1)}{x^2+5}\right) \quad x \leq -\frac{1}{2},$$

e quindi

$$f'(x) = \frac{\mp \frac{2x^2+10-2x(2x+1)}{(x^2+5)^2}}{1 + \frac{(2x+1)^2}{(x^2+5)^2}} = \pm 2 \frac{x^2+x-5}{(x^2+5)^2 + (2x+1)^2} \quad \text{if } x \leq -\frac{1}{2}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f'(x) = -\frac{8}{21} \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f'(x) = \frac{8}{21} \implies f'_-(-1) = -\frac{8}{21}, \quad f'_+(-1) = \frac{8}{21}.$$

Dunque la funzione derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$  mentre in  $x = -\frac{1}{2}$  vi è un punto angoloso.

Studiare gli intervalli di monotonia:

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x^2+x-5 \geq 0 \\ x < -\frac{1}{2} \end{cases} \iff x \leq \frac{-1-\sqrt{21}}{2}.$$

Dunque la funzione strettamente crescente in  $] -\infty, \frac{-1-\sqrt{21}}{2} [$  e strettamente decrescente in  $] \frac{-1-\sqrt{21}}{2}, -\frac{1}{2} [$ .

Inoltre

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x > -\frac{1}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x^2+x-5 \leq 0 \\ x > -\frac{1}{2} \end{cases} \iff -\frac{1}{2} < x \leq \frac{-1+\sqrt{21}}{2}.$$

Dunque la funzione strettamente crescente in  $] -\frac{1}{2}, \frac{-1+\sqrt{21}}{2} [$  e strettamente decrescente in  $] \frac{-1+\sqrt{21}}{2}, +\infty [$ .

Infine,

$$f'\left(\frac{-1+\sqrt{21}}{2}\right) = f'\left(\frac{-1-\sqrt{21}}{2}\right) = 0$$




Figure 2: Grafico della funzione.

e i punti  $\frac{-1-\sqrt{21}}{2}$ ,  $\frac{-1+\sqrt{21}}{2}$  sono di massimo relativo. Da  $f(-\frac{1}{2}) = 0$ , il punto  $x = -\frac{1}{2}$  punto di minimo assoluto.

(iii) abbozzare il grafico di  $f$ .

**Esercizio 2 [7 punti]** Determinare le soluzioni in  $\mathbb{C}$  dell'equazione

$$\left(-\frac{z}{i}\right)^3 = 27.$$

$$\left(-\frac{z}{i}\right)^3 = 27. \iff z^3 = 27i = 27 \left( \cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{2}\pi\right) \right)$$

Dobbiamo cio trovare le radici terze di  $27i$ , cio, con la formula di De Moivre,

$$z_0 = 3 \left( \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) \right) = \frac{3}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{2}i$$

$$z_1 = 3 \left( \cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{5}{6}\pi\right) \right) = -\frac{3}{2}\sqrt{3} + \frac{3}{2}i$$

$$z_2 = 3 \left( \cos\left(\frac{3}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) \right) = -3i.$$

**Esercizio 3 [7 punti]**

Studiare, utilizzando opportuni sviluppi di Mac Laurin applicati alla successione

$$a_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} + \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right), \quad \text{la convergenza della serie}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n.$$

Si ha

$$a_n = \sin\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} + \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{120n^5} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) + \alpha \frac{1}{n^3} - \alpha \frac{1}{2n^6} + o\left(\frac{\alpha}{n^6}\right) =$$

$$= \frac{-1 + 6\alpha}{6n^3} + \frac{1}{120n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right)$$

(ii) Studiare la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n.$$

Da

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{-1 + 6\alpha}{6n} + \frac{1}{120n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right)$$

segue che, per  $\alpha = \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è sempre positivo per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n^3}$ . Pertanto la serie converge. Se invece  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è di segno costante per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n}$ . Pertanto la serie diverge per  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ .

#### Esercizio 4 [8 punti]

Usando la definizione (e il metodo di sostituzione), calcolare l'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 4 \arctan t + 5)} dt.$$

*Facoltativo:* Discutere, al variare del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la convergenza dell'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{(\alpha-1)}(\arctan^2 t + 4 \arctan t + 5)} dt.$$

Consideriamo la sostituzione  $y = \arctan t$ , che implica  $dy = \frac{1}{1+t^2} dt$ :

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 4 \arctan t + 5)} dt &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^{\arctan c} \frac{y}{y^2 + 4y + 5} dy = \\ &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{2} \log((y+2)^2 + 1) - 2 \arctan(y+2) \right]_0^{\arctan c} \\ &= \frac{1}{2} \log((\pi/2 + 2)^2 + 1) - 2 \arctan(\pi/2 + 2) - \frac{1}{2} \log 5 + 2 \arctan 2 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato:

$$\begin{aligned} \int \frac{y}{y^2 + 4y + 5} dy &= \int \frac{y}{y^2 + 4y + 4 + 1} dy = \frac{1}{2} \int \frac{2(y+2)}{(y+2)^2 + 1} dy - 2 \int \frac{1}{(y+2)^2 + 1} dy = \\ &= \frac{1}{2} \log((y+2)^2 + 1) - 2 \arctan(y+2) + c, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

*Facoltativo:* Discutere, al variare del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la convergenza dell'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{(\alpha-1)}(\arctan^2 t + 4 \arctan t + 5)} dt.$$

L'integrando, per  $t \rightarrow +\infty$ , è asintotico a

$$\frac{C}{t^{2\alpha-2}}$$

per una opportuna costante positiva  $C > 0$ , dunque l'integrale converge per

$$2\alpha - 2 > 1 \iff \alpha > \frac{3}{2}.$$

### TEMA 3

**Esercizio 1 [10 punti]** Data la funzione

$$f(x) = \arctan\left(\frac{|x-5|}{x^2+3}\right),$$

(i) individuarne il dominio naturale:

$$\text{Dominio} = \mathbb{R};$$

studiarne il segno,

$$f(x) \geq 0 \iff \frac{|x-5|}{x^2+3} \geq 0. \quad \text{Dunque } f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}. \text{ Inoltre } f(x) = 0 \iff x = 5;$$

calcolare i limiti agli estremi del dominio

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan\left(\frac{|x-5|}{x^2+3}\right) \underset{y=\frac{|x-5|}{x^2+3} \rightarrow 0}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \arctan y = 0.$$

Dunque  $y = 0$  asintoto orizzontale a  $-\infty$  e a  $+\infty$ .

(ii) studiare la derivabilità di  $f$  sul suo dominio, calcolare la derivata prima:

studiamo  $f$  separatamente nelle regioni

$$x > 5 \iff |x-5| = x-5 \text{ e}$$

$$x < 5 \iff |x-5| = -x+5, \text{ per cui}$$

$$f(x) = \arctan\left(\mp \frac{(x-5)}{x^2+3}\right) \quad x \leq 5,$$

e quindi

$$f'(x) = \frac{\mp \frac{x^2+3-2x(x-5)}{(x^2+3)^2}}{1 + \frac{(x-5)^2}{(x^2+3)^2}} = \pm \frac{x^2 - 10x - 3}{(x^2+3)^2 + (x-5)^2} \quad \text{if } x \leq 5$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} f'(x) = -\frac{1}{28} \quad \lim_{x \rightarrow 5^+} f'(x) = \frac{1}{28} \implies f'_-(5) = -\frac{1}{28}, \quad f'_+(5) = \frac{1}{28}.$$

Dunque la funzione derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R} \setminus \{5\}$  mentre in  $x = 5$  vi è un punto angoloso.

Studiare gli intervalli di monotonia:

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x < 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 10x - 3 \geq 0 \\ x < 5 \end{cases} \iff x \leq 5 - 2\sqrt{7}$$

Dunque la funzione strettamente crescente in  $] -\infty, 5 - 2\sqrt{7}[$  e strettamente decrescente in  $]5 - 2\sqrt{7}, 5[$ .

Inoltre

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x > 5 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - 10x - 3 \leq 0 \\ x > 5 \end{cases} \iff 5 < x \leq 5 + 2\sqrt{7}.$$

Dunque la funzione strettamente crescente in  $]5, 5 + 2\sqrt{7}[$  e strettamente decrescente in  $]5 + 2\sqrt{7}, +\infty[$ .

Infine,

$$f'(5 + 2\sqrt{7}) = f'(5 - 2\sqrt{7}) = 0$$

e i punti  $5 + 2\sqrt{7}$ ,  $5 - 2\sqrt{7}$  sono di massimo relativo. Da  $f(5) = 0$ , il punto  $x = 5$  di minimo assoluto.




Figure 3: Grafico della funzione.

(iii) Abbozzare il grafico di  $f$ .

**Esercizio 2 [7 punti]** Determinare le soluzioni in  $\mathbb{C}$  dell'equazione

$$\left(\frac{z}{i}\right)^3 = -\frac{1}{8}.$$

$$\left(\frac{z}{i}\right)^3 = -\frac{1}{8} \iff z^3 = \frac{1}{8}i = \frac{1}{8} \left( \cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{2}\pi\right) \right)$$

Dobbiamo cioè trovare le radici terze di  $\frac{1}{8}i$ , cioè, con la formula di De Moivre,

$$z_0 = \frac{1}{2} \left( \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) \right) = \frac{1}{4}\sqrt{3} + \frac{1}{4}i$$

$$z_1 = \frac{1}{2} \left( \cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{5}{6}\pi\right) \right) = -\frac{1}{4}\sqrt{3} + \frac{1}{4}i$$

$$z_2 = 2 \left( \cos\left(\frac{3}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) \right) = -\frac{1}{2}i.$$

**Esercizio 3 [7 punti]**

Studiare, utilizzando opportuni sviluppi di Mac Laurin applicati alla successione

$$a_n = \frac{1}{n} - \sinh\left(\frac{1}{n}\right) + \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right), \quad \text{la convergenza della serie}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n.$$

Si ha

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} - \sinh\left(\frac{1}{n}\right) + \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n} - \frac{1}{6n^3} - \frac{1}{120n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) + \alpha \frac{1}{n^3} - \alpha \frac{1}{2n^6} + o\left(\frac{\alpha}{n^6}\right) = \\ &= \frac{-1 + 6\alpha}{6n^3} - \frac{1}{120n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) \end{aligned}$$



$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n.$$

Da

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{-1 + 6\alpha}{6n} - \frac{1}{120n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right)$$

segue che, per  $\alpha = \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è sempre negativo per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n^3}$ . Pertanto la serie converge. Se invece  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è di segno costante per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n}$ . Pertanto la serie diverge per  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ .

#### Esercizio 4 [8 punti]

Usando la definizione (e il metodo di sostituzione), calcolare l'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 6 \arctan t + 10)} dt.$$

Consideriamo la sostituzione  $y = \arctan t$ , che implica  $dy = \frac{1}{1+t^2} dt$ :

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 6 \arctan t + 10)} dt &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^{\arctan c} \frac{y}{y^2 + 6y + 9 + 1} dy = \\ &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{2} \log((y+3)^2 + 1) - 3 \arctan(y+3) \right]_0^{\arctan c} \\ &= \frac{1}{2} \log((\pi/2 + 3)^2 + 1) - 3 \arctan(\pi/2 + 3) - \frac{1}{2} \log 10 + 3 \arctan 3 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato:

$$\begin{aligned} \int \frac{y}{y^2 + 6y + 10} dy &= \int \frac{y}{y^2 + 6y + 9 + 1} dy = \frac{1}{2} \int \frac{2(y+3)}{(y+3)^2 + 1} dy - 3 \int \frac{1}{(y+3)^2 + 1} dy = \\ &= \frac{1}{2} \log((y+3)^2 + 1) - 3 \arctan(y+3) + c, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

*Facoltativo:* Discutere, al variare del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la convergenza dell'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{(\alpha+3)}(\arctan^2 t + 6 \arctan t + 10)} dt.$$

L'integrando, per  $t \rightarrow \infty$ , è asintotico a

$$\frac{C}{t^{2\alpha+6}}$$

per una opportuna costante  $C > 0$ , dunque l'integrale converge per

$$2\alpha + 6 > 1 \iff \alpha > -\frac{5}{2}.$$

## TEMA 4

**Esercizio 1 [10 punti]** Data la funzione

$$f(x) = \arctan\left(\frac{|2x+3|}{x^2+9}\right),$$

(i) individuare il dominio naturale:

$$\text{Dominio} = \mathbb{R};$$

studiarne il segno:

$$f(x) \geq 0 \iff \frac{|2x+3|}{x^2+9} \geq 0. \quad \text{Dunque } f(x) \geq 0 \forall x \in \mathbb{R}. \quad \text{Inoltre } f(x) = 0 \iff x = -\frac{3}{2};$$

calcolare i limiti agli estremi del dominio:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \arctan\left(\frac{|2x+3|}{x^2+9}\right) \underset{y=\frac{|2x+3|}{x^2+9}}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \arctan y = 0.$$

Dunque  $y = 0$  asintoto orizzontale a  $-\infty$  e a  $+\infty$ .

(ii) studiare la derivabilità di  $f$  sul suo dominio, calcolare la derivata prima:

studiamo  $f$  separatamente nelle regioni

$$x > -\frac{3}{2} \iff |2x+3| = 2x+3 \text{ e}$$

$$x < -\frac{3}{2} \iff |2x+3| = -2x-3, \text{ per cui si ha}$$

$$f(x) = \arctan\left(\mp \frac{(2x+3)}{x^2+9}\right) \quad x \leq -\frac{3}{2},$$

e quindi

$$f'(x) = \mp \frac{\frac{2x^2+18-2x(2x+3)}{(x^2+9)^2}}{1 + \frac{(2x+3)^2}{(x^2+9)^2}} = \pm 2 \frac{x^2+3x-9}{(x^2+9)^2 + (2x+3)^2} \quad \text{if } x \leq -\frac{3}{2}$$

e

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^-} f'(x) = -\frac{8}{45} \quad \lim_{x \rightarrow -\frac{3}{2}^+} f'(x) = \frac{8}{45} \implies f'_-\left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{8}{45}, \quad f'_+\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{8}{45}.$$

Dunque la funzione derivabile per ogni  $x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{2}\}$  mentre in  $x = -\frac{3}{2}$  vi è un punto angoloso.

Studiare gli intervalli di monotonia:

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x < -\frac{3}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x^2+3x-9 \geq 0 \\ x < -\frac{3}{2} \end{cases} \iff x \leq -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{45}}{2}$$

Dunque la funzione strettamente crescente in  $]-\infty, -\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{45}}{2}[$  e strettamente decrescente in  $]-\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{45}}{2}, -\frac{3}{2}[$ .

Inoltre

$$\begin{cases} f'(x) \geq 0 \\ x > -\frac{3}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} x^2+3x-9 \leq 0 \\ x > -\frac{3}{2} \end{cases} \iff -\frac{3}{2} < x \leq -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{45}}{2}$$

Dunque la funzione strettamente crescente in  $]-\frac{3}{2}, -\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{45}}{2}[$  e strettamente decrescente in  $]-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{45}}{2}, +\infty[$ .

Infine,

$$f'\left(-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{45}}{2}\right) = f'\left(-\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{45}}{2}\right) = 0$$




Figure 4: Grafico della funzione.

e i punti  $-\frac{3}{2} - \frac{\sqrt{45}}{2}$ ,  $-\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{45}}{2}$  sono di massimo relativo. Da  $f(-\frac{3}{2}) = 0$ , il punto  $x = -\frac{3}{2}$  di minimo assoluto.

(iii) Abbozzare il grafico di  $f$ .

**Esercizio 2 [7 punti]** Determinare le soluzioni in  $\mathbb{C}$  dell'equazione

$$\left(-\frac{z}{i}\right)^3 = \frac{1}{27}.$$

$$\left(-\frac{z}{i}\right)^3 = \frac{1}{27} \iff z^3 = \frac{1}{27}i = \frac{1}{27} \left( \cos\left(\frac{1}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{2}\pi\right) \right)$$

Dobbiamo cioè trovare le radici terze di  $(1/27)i$ , cioè, con la formula di De Moivre,

$$z_0 = \frac{1}{3} \left( \cos\left(\frac{1}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{1}{6}\pi\right) \right) = \frac{1}{6}\sqrt{3} + \frac{1}{6}i$$

$$z_1 = \frac{1}{3} \left( \cos\left(\frac{5}{6}\pi\right) + i \sin\left(\frac{5}{6}\pi\right) \right) = -\frac{1}{6}\sqrt{3} + \frac{1}{6}i$$

$$z_2 = \frac{1}{3} \left( \cos\left(\frac{3}{2}\pi\right) + i \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right) \right) = -\frac{1}{3}i.$$

**Esercizio 3 [7 punti]**

Studiare, utilizzando opportuni sviluppi di Mac Laurin applicati alla successione

$$a_n = \sinh\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} - \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right), \quad \text{la convergenza della serie}$$

Si ha

$$\begin{aligned} a_n &= \sinh\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} - \alpha \log\left(1 + \frac{1}{n^3}\right) = \frac{1}{n} + \frac{1}{6n^3} + \frac{1}{120n^5} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) - \alpha \frac{1}{n^3} + \alpha \frac{1}{2n^6} + o\left(\frac{\alpha}{n^6}\right) = \\ &= \frac{1 - 6\alpha}{6n^3} + \frac{1}{120n^5} + o\left(\frac{1}{n^5}\right) \end{aligned}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n.$$

Da

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1-6\alpha}{6n} + \frac{1}{120n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right)$$

segue che, per  $\alpha = \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è sempre positivo per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n^3}$ . Pertanto la serie converge. Se invece  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ , il termine generico della serie è di segno costante per  $n$  sufficientemente grande ed asintotico a  $\frac{1}{n}$ . Pertanto la serie diverge per  $\alpha \neq \frac{1}{6}$ .

#### Esercizio 4 [8 punti]

Usando la definizione, (e il metodo di sostituzione) calcolare l'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 2 \arctan t + 2)} dt.$$

*Facoltativo:* Discutere, al variare del parametro  $\alpha \in \mathbb{R}$ , la convergenza dell'integrale generalizzato

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan t}{(1+t^2)^{\alpha-2}(\arctan^2 t + 2 \arctan t + 2)} dt.$$

Consideriamo la sostituzione  $y = \arctan t$ , che implica  $dy = \frac{1}{1+t^2} dt$ :

$$\begin{aligned} \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^c \frac{\arctan t}{(1+t^2)(\arctan^2 t + 2 \arctan t + 2)} dt &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_0^{\arctan c} \frac{y}{y^2 + 2y + 2} dy = \\ &= \lim_{c \rightarrow +\infty} \left[ \frac{1}{2} \log((y+1)^2 + 1) - \arctan(y+1) \right]_0^{\arctan c} \\ &= \frac{1}{2} \log((\pi/2 + 1)^2 + 1) - \arctan(\pi/2 + 1) - \frac{1}{2} \log 2 + \pi/4 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato:

$$\begin{aligned} \int \frac{y}{y^2 + 2y + 2} dy &= \int \frac{y}{y^2 + 2y + 1 + 1} dy = \frac{1}{2} \int \frac{2(y+1)}{(y+1)^2 + 1} dy - \int \frac{1}{(y+1)^2 + 1} dy = \\ &= \frac{1}{2} \log((y+1)^2 + 1) - \arctan(y+1) + c, \quad c \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

*Facoltativo:* l'integrando, per  $t \rightarrow +\infty$ , è asintotico a

$$\frac{C}{t^{2\alpha-4}}$$

per una opportuna costante  $C > 0$ , dunque l'integrale converge per

$$2\alpha - 4 > 1 \iff \alpha > \frac{5}{2}.$$

**NB:** con log si indica il logaritmo in base  $e$ .

---

Tempo a disposizione: 2 ore.

È vietato tenere con sé, anche spenti, telefoni e calcolatrici di qualsiasi tipo e usare libri e appunti. Ogni affermazione deve essere adeguatamente giustificata.

*Alcuni sviluppi di Mac Laurin.*

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^m (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2m+1}) \quad \forall m \geq 0$$

$$\log(1+x) = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} \frac{x^k}{k} + o(x^m) \quad \forall m \geq 1$$